

## Alergia a penicilinas (betalactámicos)

---

Si usted es alérgico a betalactámicos debe saber lo siguiente:

1. No debe tomar ningún medicamento que en su composición lleve **Penicilina** ni derivados (coméntelo con su médico):
  - **Penicilinas naturales:** Bencilpenicilina (Penicilina G), Fenoximetilpenicilina (Penicilina V), Feneticilina.
  - **Penicilinas resistentes a Penicilinasa:** Meticilina, Nafcilina, Oxacilina, Cloxacilina, Dicloxacilina.
  - **Aminopenicilinas:** Ampicilina, Amoxicilina, Bacampicilina, Metampicilina, Pivampicilina, y sus asociaciones con Clavulánico o Sulbactam.
  - **Carboxi-ureido-penicilinas:** Carbenicilina, Ticarcilina, Azlocilina, Mezlocilina, Piperacilina (y su asociación con Tazobactam) .
  - **Amidinopenicilinas:** Mecilinam.
  - **Monobactámicos:** Aztreonam.
  - **Carbapenemes:** Imipenem, Meropenem.
  - **Cefalosporinas 1ª generación:** Cefadroxilo, Cefalexina, Cefradina, Cefalotina, Cefapirina, Cefazolina.
  - **Cefalosporinas 2ª generación:** Cefaclor, Cefprozilo, Cefminox, Cefoxitina, Cefamandol, Cefonicida, Cefuroxima.
  - **Cefalosporinas 3ª generación:** Cefixima, Cefpodoxima, Ceftibuteno, Cefotaxima, Ceftizoxima, Ceftriaxona, Cefoperazona, Ceftazidima.
  - **Cefalosporinas 4ª generación:** Cefepima, Cefpiroma.
2. Puede utilizar el resto de los antibióticos no relacionados con las penicilinas.
3. Utilizar preferentemente la vía de administración oral.
4. Utilizar preferentemente medicamentos de un solo componente.
5. Tomar solo los medicamentos recomendados por su médico.  
**No se automedique.**
6. Mostrar este informe siempre que acuda al médico.